ANQ					Dimdi ICD-10 GM Version 2021 (ohne Fussnoten - deren Inhalte integriert in Zellen)	
EBI	**Punkte**	**Überleitung ADL**	**CHOP-Kodes**	**CHOP-Score**	**Barthel-Index**	**Punkte Barthel-Index / EBI ICD-10**
1. Essen und Trinken					**Essen**	
Nicht möglich. Oder: Ernährung über Magensonde (PEG oder Nasensonde), die nicht selbständig bedient werden kann.	0	0	AA.13.11	Score 0	kein selbständiges Einnehmen und keine MS/PEG-Ernährung MS = Magensonde / PEG =perkutane endoskopische Gastrostomie	0
Essen muss vorbereitet werden (z.B. Zurechtschneiden von Fleisch und Gemüse).	2	2	AA.13.12	Score 2	Hilfe bei mundgerechter Vorbereitung, aber selbständiges Einnehmen oder Hilfe bei PEG-Beschickung/-Versorgung	5
Essen (ohne Vorbereitung) mit Hilfsmitteln alleine möglich, z.B. Frühstücksbrett, verdickte Griffe etc. Oder: Magensonde kann selbständig bedient werden.	3	3 - 4	AA.13.13	Score 4	komplett selbständig oder selbständige PEG-Beschickung/-Versorgung	10
Selbständig.	4	3 - 4	AA.13.13	Score 4	komplett selbständig oder selbständige PEG-Beschickung/-Versorgung	10
2. Persönliche Pflege					**Sich waschen**	
Nicht möglich.	0	0	AA.13.21	Score 0	erfüllt "5" nicht	0
Unterstützung durch eine Hilfsperson bei einigen, aber nicht allen Abläufen nötig.	1	1	AA.13.22	Score 1	erfüllt "5" nicht	0
Mit geringer Unterstützung möglich (z.B. Aufschrauben der Zahnpastatube). Oder: Keine direkte Unterstützung, aber Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einigen Abläufen nötig.	2	2	AA.13.23	Score 2	erfüllt "5" nicht	0
Persönliche Pflege mit Hilfsmitteln alleine möglich, z.B. Verlängerungsgriff für Kamm, Waschlappen, Bürste.	3	3 - 4	AA.13.24	Score 4	vor Ort komplett selbständig inkl. Zähneputzen, Rasieren und Frisieren	5
Selbständig (in allen oben genannten Bereichen; als selbständig werden auch solche Patienten eingestuft, die z.B. ihr Haar nicht stilgerecht flechten können.)	4	3 - 4	AA.13.24	Score 4	vor Ort komplett selbständig inkl. Zähneputzen, Rasieren und Frisieren	5
3. An-/Ausziehen					**An- und Auskleiden**	
Nicht möglich.	0	0	AA.13.31	Score 0	erfüllt "5" nicht	0
Unterstützung beim An- oder Ausziehen der meisten, aber nicht aller Kleidungsstücke nötig. Oder: zeigt effektive Mitarbeit, obwohl eine Unterstützung beim An- und Ausziehen aller Kleiderstücke nötig ist.	1	1	AA.13.32	Score 1	erfüllt "5" nicht	0
Unterstützung nur bei wenigen Prozeduren (z.B.: Hilfe beim Schuhe binden, beim Knöpfe auf oder zumachen, beim Anziehen von elastischen Strümpfen oder Hilfsmitteln wie z.B. Schienen). Oder: keine direkte Unterstützung, aber Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einige Abläufen nötig.	2	2	AA.13.33	Score 2	kleidet mindestens den Oberkörper in angemessener Zeit selbständig an und aus, sofern die Utensilien in greifbarer Nähe sind	5
Selbständig (erlaubt sind z.B. auch Strumpfanzieher).	4	4	AA.13.34	Score 4	zieht sich in angemessener Zeit selbständig Tageskleidung, Schuhe (und ggf. benötigte Hilfsmittel z.B. Antithrombose-Strümpfe, Prothesen) an und aus	10
4. Baden/Duschen/Körper waschen					**Baden / Duschen**	
Nicht möglich.	0	0	AA.13.41	Score 0	erfüllt "5" nicht	0
Unterstützung durch eine Hilfsperson bei einigen, aber nicht allen Abläufen nötig (z.B. Unterstützung bei erforderlichen Transfers oder beim Abtrocknen nötig; kann sich oben herum waschen, benötigt jedoch Hilfe beim Waschen der unteren Körperpartie).	1	1	AA.13.42	Score 1	erfüllt "5" nicht	0
Mit geringer Unterstützung möglich (z.B. Aufschrauben der Bade-Utensilien). Oder: keine direkte Unterstützung, aber Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einigen Abläufen nötig.	2	2	AA.13.43	Score 2	erfüllt "5" nicht	0
Hilfsmittel nötig (wie z.B. Lift, Bade- oder Duschsitz), die jedoch selbständig bedient werden können.	3	3 - 4	AA.13.44	Score 4	selbständiges Baden oder Duschen inkl. Ein-/Ausstieg, sich reinigen und abtrocknen	5
Selbständig.	4	3 - 4	AA.13.44	Score 4	selbständiges Baden oder Duschen inkl. Ein-/Ausstieg, sich reinigen und abtrocknen	5

Mit bestem Dank an D. Gantner, Rehaklinik Schönberg Gunten und G. Brupbacher, Oberwaid AG

ANQ					Dimdi ICD-10 GM Version 2021 (ohne Fussnoten - deren Inhalte integriert in Zellen)	
EBI	Punkte	Überleitung ADL	CHOP-Kodes	CHOP-Score	Barthel-Index	Punkte Barthel-Index / EBI ICD-10
5. Umsteigen aus Rollstuhl in Bett und umgekehrt					**Aufsetzen und Umsetzen**	
Nicht möglich.	0	0	AA.13.51	Score 0	wird faktisch nicht aus dem Bett transferiert	0
Unterstützung einer Hilfsperson bei einigen, aber nicht allen Abläufen nötig.	1	1	AA.13.52	Score 1	erhebliche Hilfe (geschulte Laienhilfe oder professionelle Hilfe)	5
Keine direkte Unterstützung, aber Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einige Abläufen nötig (z.B. Muss erinnert werden, die Bremse festzustellen).	2	2	AA.13.53	Score 2	Aufsicht oder geringe Hilfe (ungeschulte Laienhilfe)	10
Selbständig.	4	4	AA.13.54	Score 4	komplett selbständig aus liegender Position in (Roll-)Stuhl und zurück	15
6. Fortbewegung auf ebenem Untergrund					**Aufstehen und Gehen**	
Nicht möglich (weder Gehen noch Fortbewegung mit Rollstuhl).	0	0	AA.13.61	Score 0	erfüllt "5" nicht	0
Benötigt Rollstuhl oder Gehwagen, den er aber weitgehend selbständig bedienen kann (d.h.: bewältigt längere Strecken, stösst nicht an Hindernisse, kann Kurven fahren, wenden etc. und benötigt allenfalls in seltenen Fällen geringe Unterstützung). Oder: Patient kann kürzere Strecken (kleiner 50 m) gehen, aber nur mit einer Hilfsperson.	1	1	AA.13.62	Score 1	mit Laienhilfe oder Gehwagen vom Sitz in den Stand kommen und Strecken im Wohnbereich bewältigen alternativ: im Wohnbereich komplett selbständig im Rollstuhl	5
Kann selbständig kürzere Strecken (kleiner 50 m) ohne Hilfsperson oder Geländer gehen, benötigt jedoch für längere Strecken (grösser 50 m) einen Rollstuhl oder Gehwagen oder Supervision.	2	2	AA.13.63	Score 2	ohne Aufsicht oder personelle Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m mit Hilfe eines Gehwagens gehen	10
Kann selbständig längere Strecken (grösser 50 m) ohne Gehwagen oder Geländer gehen, benötigt aber Stock, Krücke, Schienen oder ähnliches.	3	3	AA.13.64	Score 3	ohne Aufsicht oder personelle Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m ohne Gehwagen (aber ggf. mit Stöcken/Gehstützen) gehen	15
Selbständiges Gehen auch über längere Strecken ohne jegliche Hilfe oder Hilfsmittel möglich.	4	4	AA.13.65	Score 4	ohne Aufsicht oder personelle Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m ohne Gehwagen (aber ggf. mit Stöcken/Gehstützen) gehen	15
7. Treppen auf-/absteigen					**Treppensteigen**	
Nicht möglich.	0	0	AA.13.71	Score 0	erfüllt "5" nicht	0
Möglich, aber nur mit erheblicher Unterstützung durch eine Person (z.B. Hilfe beim Hochheben eines Beines).	1	1	AA.13.72	Score 1	erfüllt "5" nicht	0
Möglich, aber geringe Unterstützung oder Supervision durch eine Person.	2	2	AA.13.73	Score 2	mit Aufsicht oder Laienhilfe mind. ein Stockwerk hinauf und hinunter	5
Selbständig möglich (zugelassen sind Festhalten am Geländer, Benutzen von Stock, Krücke oder ähnlichem).	4	4	AA.13.74	Score 4	ohne Aufsicht oder personelle Hilfe (ggf. inkl. Stöcken/Gehstützen) mindestens ein Stockwerk hinauf- und hinuntersteigen)	10
8. Benützung der Toilette					**Toilettenbenutzung**	
Nicht möglich (weder Gehen noch Fortbewegung mit Rollstuhl).	0	0	AA.13.81	Score 0	benutzt faktisch weder Toilette noch Toilettenstuhl	0
Unterstützung einer Hilfsperson bei einigen, aber nicht allen Abläufen nötig (z.B. selbständiger Transfer, jedoch Hilfe beim An- / Auskleiden).	1	1	AA.13.82	Score 1	vor Ort Hilfe oder Aufsicht bei Toiletten- oder Toilettenstuhlbenutzung oder deren Spülung / Reinigung erforderlich	5
Keine direkte Unterstützung, jedoch Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einigen Abläufen nötig (muss z.B. erinnert werden, die Wasserspülung zu bedienen).	2	2	AA.13.83	Score 2	vor Ort Hilfe oder Aufsicht bei Toiletten- oder Toilettenstuhlbenutzung oder deren Spülung / Reinigung erforderlich	5
Selbständig bzw. Selbständigkeit bei diesen Tätigkeiten nicht nötig (z.B. weil komplette Versorgung mit Windeln oder Puffi / Dauerkatheter erfolgt, die Toilette also gar nicht benutzt wird).	4	4	AA.13.84	Score 4	vor Ort komplett selbständige Nutzung von Toilette oder Toilettenstuhl inkl. Spülung / Reinigung	10

Mit bestem Dank an D. Gantner, Rehaklinik Schönberg Gunten und G. Brupbacher, Oberwaid AG

ANQ					Dimdi ICD-10 GM Version 2021 (ohne Fussnoten - deren Inhalte integriert in Zellen)	
EBI	**Punkte**	**Überleitung ADL**	**CHOP-Kodes**	**CHOP-Score**	**Barthel-Index**	**Punkte Barthel-Index / EBI ICD-10**
9. Stuhlkontrolle					**Stuhlkontinenz**	
Nicht möglich.	0	0	AA.13.91	Score 0	ist durchschnittlich mehr als 1x/Woche stuhlinkontinent	0
Es kommt zu gelegentlicher Inkontinenz (mindesten einmal pro Woche, aber nicht täglich) und er kann sich nicht selbständig mit Windeln versorgen und nicht selbständig reinigen. Oder: es ist gelegentlich (mindestens einmal pro Woche, aber nicht täglich) die Unterstützung einer Person bei der Stuhlregulierung erforderlich (z.B.: Klistier).	2	2	AA.13.92	Score 2	ist durchschnittlich nicht mehr als 1x/Woche stuhlinkontinent oder benötigt Hilfe bei rektalen Abführmaßnahmen / Anus-praeter(AP)-Versorgung	5
Gestörte Stuhlkontrolle, kann jedoch Windeln selbständig wechseln, sich selbständig reinigen oder selbständig stuhlregulierende Massnahmen vornehmen.	3	3 - 4	AA.13.93	Score 4	ist stuhlkontinent, ggf. selbständig bei rektalen Abführmaßnahmen oder AP-Versorgung	10
Normale Stuhlkontrolle (auch: Stuhlinkontinenz, die seltener als einmal pro Woche vorkommt).	4	3 - 4	AA.13.93	Score 4	ist stuhlkontinent, ggf. selbständig bei rektalen Abführmaßnahmen oder AP-Versorgung	10
10. Harnkontrolle					**Harnkontinez**	
Komplette oder sehr häufige Inkontinenz (mehrmals täglich) und kann Windeln nicht selbständig wechseln. Oder: kann Versorgung von Puffi oder Dauerkatheter nicht selbständig durchführen bzw. sich nicht selbst einmalkatheterisieren.	0	0	AA.13.A1	Score 0	ist durchschnittlich mehr als 1x/Tag harninkontinent	0
Inkomplette Inkontinenz (maximal 1 x täglich), kann sich nicht selbständig mit Windeln/ Urinalkondom versorgen und sich nicht selbständig reinigen.	1	1	AA.13.A2	Score 1	kompensiert seine Harninkontinenz selbständig und mit überwiegendem Erfolg (durchschnittlich nicht mehr als 1x/Tag Einnässen von Kleidung oder Bettwäsche) oder benötigt Hilfe bei der Versorgung seines Harnkathetersystems	5
Komplette oder inkomplette Inkontinenz, benötigt aber keinerlei Hilfe (beim Wechseln von Windeln / Urinalkondom, beim sich Säubern, bei der Puffi- oder Dauerkatheterversorgung bzw. bei der Einmalkatheterisierung.	3	3 - 4	AA.13.A3	Score 4	ist harnkontinent oder kompensiert seine Harninkontinenz / versorgt seinen Dauerkatheter (DK) komplett selbständig und mit Erfolg (kein Einnässen von Kleidung oder Bettwäsche)	10
Normale Harnkontinenz.	4	3 - 4	AA.13.A3	Score 4	ist harnkontinent oder kompensiert seine Harninkontinenz / versorgt seinen Dauerkatheter (DK) komplett selbständig und mit Erfolg (kein Einnässen von Kleidung oder Bettwäsche)	10
11. Verstehen					**Verstehen (Erweiterter Barthel-Index)**	
Nicht möglich. Selbst einfache Instruktionen oder Fragen werden nicht verstanden; ist auch nicht in der Lage Geschriebenes zu verstehen oder durch Mimik oder Gestik vermittelten Aufforderungen zuverlässig nachzukommen.	0	0	AA.13.B1	Score 0	Verstehen nicht vorhanden	0
Versteht einfache Instruktionen (z.B. „Nehmen Sie bitte die Tablette ein"), in gesprochener oder geschriebener oder mimischer oder gestischer Form.	1	1	AA.13.B2	Score 1	versteht einfache Aufforderungen	5
Versteht komplexe Sachverhalte (z.B. „bevor Sie mit dem Essen beginnen, nehmen Sie diese Tablette ein"), jedoch nicht immer ganz zuverlässig. Oder: kann nur Geschriebenes zuverlässig verstehen.	3	3	AA.13.B3	Score 3	versteht komplexe Sachverhalte, aber nicht immer	10
Normales Verstehen (umfasst auch Patienten, die auf Hörhilfen angewiesen sind, nicht jedoch Patienten, die nur Geschriebenes verstehen).	4	4	AA.13.B4	Score 4	ungestört (nicht Patienten, die nur Geschriebenes verstehen)	15
12. Verständlichkeit					**Sich verständlich machen (Erweiterter Barthel-Index)**	
Kann sich nie oder fast nie verständlich machen.	0	0	AA.13.C1	Score 0	kann sich nicht oder fast nicht verständlich machen	0
Kann nur einfache alltägliche Sachverhalte (z.B. Hunger, Durst, etc.) ausdrücken, sei es mit oder ohne Hilfsmittel (z.B. Geschriebenes, Kommunikator).	1	1	AA.13.C2	Score 1	kann einfache Sachverhalte ausdrücken	5
Kann sich praktisch über alles verständlich machen, jedoch nur mit Hilfsmitteln (z.B. Geschriebenes, Kommunikator).	3	3 - 4	AA.13.C3	Score 4	kann sich über fast alles verständlich machen	15
Kann sich ohne Hilfsmittel praktisch über alles verständlich machen (grammatikalische Fehler, leichte Wortfindungsschwierigkeiten bzw. leicht undeutliches Sprechen sind zulässig).	4	3 - 4	AA.13.C3	Score 4	kann sich über fast alles verständlich machen	15

Mit bestem Dank an D. Gantner, Rehaklinik Schönberg Gunten und G. Brupbacher, Oberwaid AG

ANQ					Dimdi ICD-10 GM Version 2021 (ohne Fussnoten - deren Inhalte integriert in Zellen)	
EBI	**Punkte**	**Überleitung ADL**	**CHOP-Kodes**	**CHOP-Score**	**Barthel-Index**	**Punkte Barthel-Index / EBI ICD-10**
13. Soziale Interaktion					**Soziale Interaktion (Erweiterter Barthel-Index)**	
Ist immer oder fast immer unkooperativ (z.B. widersetzt sich pflegerischen Bemühungen), aggressiv, distanzlos oder zurückgezogen.	0	0	AA.13.D1	Score 0	immer oder fast immer unkooperativ	0
Ist gelegentlich unkooperativ, aggressiv, distanzlos oder zurückgezogen.	2	2	AA.13.D2	Score 2	gelegentlich unkooperativ, aggressiv, distanzlos oder zurückgezogen	5
Normale soziale Interaktion.	4	4	AA.13.D3	Score 4	ungestört	15
14. Problemlösen					**Lösen von Alltagsproblemen (Erweiterter Barthel-Index)**	
Beispiele von Störungen des Problemlösens im Alltag sind: vorschnelles Handeln (z.B. Aufstehen aus dem Rollstuhl, ohne vorher die Bremsen zu fixieren); unflexibles Verhalten (z.B. Schwierigkeiten sich an einen veränderten Tagesablauf anzupassen); Nichteinhalten von Terminen; Schwierigkeiten bei der selbstständigen Einnahme der Medikamente (die nicht durch motorische Behinderung bedingt sind); gestörte Einsicht in die Defizite bzw. ihre Alltagskonsequenzen.□					Planung von Handlungsabläufen, Umstellungsfähigkeit, Einhalten von Terminen, pünktliche Medikamenteneinnahme, Einsicht in Defizite und deren Konsequenzen im Alltag	
Benötigt aufgrund oben aufgeführter Störungen erhebliche Hilfestellung.	0	0	AA.13.E1	Score 0	benötigt erhebliche Hilfestellung	0
Benötigt aufgrund oben aufgeführter Störungen geringe Hilfestellung.	2	2	AA.13.E2	Score 2	benötigt geringe Hilfestellung	5
Benötigt aufgrund oben aufgeführter Störungen keinerlei Hilfestellung.	4	4	AA.13.E3	Score 4	im Wesentlichen ungestört	15
15. Gedächtnis/Lernfähigkeit/Orientierung					**Gedächtnis, Lernen und Orientierung (Erweiterter Barthel-Index)**	
Ist desorientiert oder verwirrt und zeigt eine starke Weglauftendenz.	0	0 - 1	AA.13.F1	Score 0	desorientiert, mit oder ohne Tendenz zum Weglaufen	0
Ist desorientiert oder verwirrt, zeigt jedoch keine Weglauftendenz; allerdings hat er Schwierigkeiten sich in der Klinik zurechtzufinden. Oder: kann neue Informationen überhaupt nicht behalten (z.B. kennt seine Bezugspersonen in der Klinik auch nach mehreren Kontakten nicht, vergisst Gesprächsinhalte, Abmachungen, Aufbewahrungsort von Gegenständen) und kann externe Gedächtnishilfen (z.B. Kalender, Notizblock) nicht einsetzen.	1	0 - 1	AA.13.F1	Score 0	desorientiert, mit oder ohne Tendenz zum Weglaufen	0
Muss häufig erinnert werden.	2	2 - 3	AA.13.F2	Score 2	muss häufig erinnert werden	5
Muss nur gelegentlich erinnert werden.	3	2 - 3	AA.13.F2	Score 2	muss gelegentlich erinnert werden oder verwendet externe Gedächtnishilfen	10
Keine alltagsrelevante Beeinträchtigung. Oder: kann externe Gedächtnishilfen wirksam einsetzen. Oder: benötigt trotz Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen wegen dieser Störungen keinen zusätzlichen (pflegerischen) Aufwand (z.B. völlig immobiler Patient mit schweren Orientierungsstörungen).	4	4	AA.13.F3	Score 4	im Wesentlichen ungestört (kein zusätzlicher Pflegeaufwand erforderlich)	15
16. Sehen/Neglect					**Sehen und Neglect (Erweiterter Barthel-Index)**	
Findet sich aufgrund der Sehstörung / des Neglects auch in bekannter Umgebung (z.B. eigenes Zimmer oder Station) nicht ausreichend zurecht. Oder. übersieht bzw. stösst häufig an Hindernisse bzw. Personen.	0	-	-	-	findet sich auch in bekannter Umgebung nicht ausreichend zurecht (findet z.B. eigenes Zimmer oder Station nicht / übersieht oder stößt an Hindernisse oder Personen)	0
Findet sich in bekannter Umgebung zurecht und übersieht nicht bzw. stösst nicht oder nur selten an Hindernisse bzw. Personen an; er findet sich jedoch in unbekannter Umgebung (z.B. Klinikbereich ausserhalb der Station) nicht zurecht.	1	-	-	-	findet sich in bekannter, aber nicht in unbekannter Umgebung zurecht	5
Hat schwere Lesestörung, findet sich jedoch in bekannter und unbekannter Umgebung gut zurecht, sei es mit oder ohne Hilfen (z.B.: Blindenhund, Stock). Oder: benötigt für gute Leseleistungen spezielle Hilfsmittel (z.B. Leselupe, Grossdruckbücher,besondere Leselampe, Zeilenlineal).	3	-	-	-	schwere Lesestörung, findet sich aber (ggf. mit Hilfsmitteln) in bekannter und unbekannter Umgebung zurecht	10
Keine alltagsrelevante Beeinträchtigung (Brillenträger werden dieser Kategorie zugeordnet). Oder: benötigt trotz Sehstörungen oder Neglect wegen dieser Störungen keinen zusätzlichen (pflegerischen) Aufwand (z.B. völlig immobiler Patient mit schwerer Sehstörung).	4	-	-	-	im Wesentlichen ungestört	15

Mit bestem Dank an D. Gantner, Rehaklinik Schönberg Gunten und G. Brupbacher, Oberwaid AG

ICD-Kodierung aus Summe Punkte Barthel ICD10 U50.-		
U50.-	**Motorische Funktionseinschränkung**	**Summe Punkte Barthel Index ICD-10**
U50.00	keine oder geringe	100
U50.10	leichte motorische	80-95
U50.20	mittlere motorische	60-75
U50.30	mittelschwere motorische	40-55
U50.40	schwere motorische	20-35
U50.50	sehr schwere motorische	0-15

ICD-Kodierung aus Summe Punkte EBI ICD10 U51.-		
U51.-	**Kognitive Funktionseinschränkung**	**Summe Punkte aus EBI ICD-10**
U51.00	Keine oder leichte	70-90
U51.10	Mittlere	20-65
U51.20	Schwere	0-15